

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

စာအမှတ်၊ PPD-၀၁ / ၂၀၂၆ (၅၉၀)
ရက်စွဲ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၅ ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။ ငရုတ် စိုက်ခင်းများတွင် ပိုးမွှား/ရောဂါ/ပေါင်း ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်
ရန်သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

၁။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာမှုကြောင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ ငရုတ် စိုက်ခင်း
များ၌ ပိုးမွှား/ ရောဂါ/ ပေါင်း များအချိန်မရွေးကျရောက်လာနိုင်ပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များအတွင်း စိုက်ပျိုးထားရှိသော ငရုတ်
စိုက်ခင်းများတွင် ပိုးမွှား/ရောဂါ/ပေါင်း ကျရောက်ခြင်းကြောင့် ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု မရှိ
စေရန်အတွက် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနည်းလမ်းများအား
လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် သတိပေးချက်ပေးပို့ခြင်းနှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်မှုများရှိပါက သီးနှံ
ကာကွယ်ရေး ဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်) သို့ ချက်ချင်းသတင်းပို့ရန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာခရိုင်၊ မြို့နယ်များ သိရှိ
လိုက်နာစေရေး အကြောင်း ကြားပါ သည်။

(ဇော်လင်း)

ညွှန်ကြားရေးမှူး

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး(.....)

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန။

မိတ္ထူကို

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ရုံးခန်း)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(နည်းပညာ/တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်/ စီမံစီမံကိန်း၊

ငွေစာရင်း / စက်မှုသီးနှံ) ၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ညွှန်ကြားရေးမှူး (ဥယျာဉ်ခြံ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် အပင်ဇီဝနည်းပညာဌာနခွဲ) ၊ စိုက်ပျိုး
ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးလက်ခံ

**ငရုတ်သီးနှံတွင်ကျရောက်တတ်သောအင်းဆက်ဖျက်ပိုးများနှင့်ဘက်စုံကာကွယ်
နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ**

စဉ်	ဖျက်ပိုး	ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ
၁။	ငမြောင်တောင် Armyworm <i>Spodoptera Litura</i> (Fabricius, 1775) Lepidoptera: Noctuidae	(၁) ပေါင်းမြက်များအားရှင်းလင်း၍ ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များအား မီးရှို့ပါ။ (၂)မြေပြင်ချိန်တွင် ခိုအောင်းနေသော ရုပ်ဖုံးများ၊ လောက်ကောင် များအား နှိမ်နင်းရန် ထယ်ထိုးထွန်မွေပါ။ (၃)ဘဲလွှတ်ကျောင်းပါ။ (၄) မီးထောင်ချောက်ထွန်း၍အကောင်ကြီးများအားဖမ်းယူပါ။ (၅)လိုအပ်ပါက ထိသေစားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းစာ အတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ • ဆိုက်ပါမီသရင် (Cypermethrin) • လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-Cyhalothrin) • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • ဒိုင်ယာဇီနွန်(Diazinon) • အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုရိတ်+ လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်(Emamectin Benzoate + Lambda-cyhalothrin)
၂။	လှေးပိုး/သရစ် ပိုး Chilli Thrip <i>Scirtothrips dorsalis</i> (Hood, 1919) Thysanoptera : Thripidae	(၁) ပင်စိမ်းပင်များကို စိုက်ခင်းပတ်လည်တွင် စိုက်ပေးပါ။ (၂)လှေး/သရစ်ပိုးပေါက်ပွားမှုကို ဟန့်တားရန် ပျိုးပင်များပေါ်မှရေဖျန်းပါ။ (၃)မစိုက်မီမျိုးစေ့အားအင်မီဒါကလိုပရစ်ဒ် (Imidacloprid 600FS/ Imidacloprid 70SS) ဆေးဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။ (၄) အပြာရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက် အားတစ်ဧကလျှင် (၃-၆) ခု အသုံးပြု၍ အကောင်ကြီး များအားဖမ်းယူပါ။ (၅)ပင်လုံးပြန့် အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းစာအ တိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate) • ဖစ်ပရိုနေးလ် (Fipronil)

		• ကာဘိုဆာလဖန်(Carbosufan) • ကလိုဖန်နာပြာ (Chlorfenapyr)
၃။	ပင်ဖြတ်ပိုး Black cutworm <i>Agrotis ipsilon</i> (Hufnagel, 1766) Lepidoptera: Noctuidae	(၁)မီးထောင်ချောက်များတစ်ကွင်းတစ်စပ်တည်းထွန်းပါ။ (၂)စိုက်ခင်းတစ်ကွက်မှ တစ်ကွက်မကူးနိုင်ရန် (၁-၂) ပေအကျယ် မြောင်းတူး၍ မြောင်းအတွင်း ကျနေသော ပိုးလောက်ကောင်များ ရှာဖွေဖျက်ဆီး ပါ။ (၃) အရွက်အောက်တွင်ရှိသော ဥအစုများ၊ အကောင်ငယ်များကို ဖျက်ဆီးပါ။ (၄) ထိသေ၊ စားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးများ အားညနေပိုင်းတွင် ဆေးအညွှန်းစာ အတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုရိတ်+ လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်(Emamectin Benzoate + Lambda-cyhalothrin) • ဆိုက်ပါမီသရင် (Cypermethrin)
၄။	ပျံပိုး Cotton Aphid <i>Aphis gossypii</i> (Glover, 1877) Hemiptera: Aphididae	(၁) ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပဲမျိုးရင်းဝင်အပင်များနှင့် ပေါင်းမြက်များကို ရှင်းလင်းပါ။ (၂) ဖျက်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများ အားရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။ (၃) အပင်များကို စောလျင်စွာစိုက်ပျိုးပါ။ (၄)နံနက်စောစော စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင် လေတင်ဘက်မှ မီးခိုးမှိုင်း တိုက်ပါ။ (၅)မစိုက်မီမျိုးစေ့အား အီမီဒါကလိုပရစ်ဒ် (Imidacloprid 600FS/ Imidacloprid 70SS) ဆေးဖြင့် လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။ (၆) အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက် အားတစ်ဧကလျှင် (၃-၆) ခု အသုံးပြု၍ အကောင်ကြီး များအားဖမ်းယူပါ။ (၇) အသီးများထွက်ပြီးပါက အပင်ထိပ်ပိုင်းများကို ဖြတ်ပေးခြင်းဖြင့် ပျံပိုးကျရောက်မှုနှင့် အသီးများထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ပါ။ (၈)ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို

		ဆေးအညွှန်းစာအ တိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate) • ဖစ်ပရိုနေးလ် (Fipronil) • ကာဘိုဆာလဖန် (Carbosufan) • အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid)
၅။	သီးထိုးပိုး Fruit borer <i>Helicoverpa armigera</i> (Hübner, 1808) Lepidopetra: Noctuidae ဖူးစားပိုး Oriental tobacco budworm <i>Helicoverpa assulta</i> (Guenée, 1852) Lepidopetra: Noctuidae	(၁) နွေထယ်ရေးခံပါ။ (၂) အတန်း (၅-၆) တန်းတိုင်း ပဲစဉ်းငုံနှင့်သီးညှပ်စိုက်ပါ။ (၃) ဖျက်ပိုးကျရောက်မှု သိရှိရန်နှင့် ဖလံဖမ်း ရန် တစ်ဧကလျှင် အလင်း ရောင်ထောင် ချောက် (၁) ခုထောင်ပါ။ (၄) ဖျက်ပိုးကျရောက်မှုကို သိရှိရန်နှင့် ဖလံထီးများကို ထောင်ချောက်ဆင်ရန် တစ်ဧကလျှင် ဖီရိုမုန်း ထောင်ချောက် (၂)ခုထောင်ပါ။ (၅) ထရိုင်ဂိုဂရားမားနဂျီ (<i>Trichogramma</i>) လွှတ်ပေးပါ။ (၆) ဖျက်ပိုးဖျက်ထား၍ပျက်စီးနေသောအသီးများနှင့်လောက် ကောင်များအားဖယ်ရှားပါ။ (၇) ပင့်ကူများ၊ နှာတံရှည်နှံကောင်များ၊ ပုရွက်ဆိတ်များ၊ ပုဇင်းများ၊ လိပ်ခုံးကျိုင်းများ၊ ဇာတောင်ပိုး များကဲ့သို့သော ဇီဝထိန်းချုပ်ပိုးမွှားများကို ထိန်းသိမ်းပါ။ (၈) လိုအပ်ပါက ထိသေစားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ် ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းစာ အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ • သိုင်အိုဒီကပ် (Thiodicarb) • အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုရိတ် (Emamectin Benzoate) • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • အင်ဒိုဇာကပ် (Indoxacarb) • ကာဘာရိုင်း (Carbaryl) • စပီနိုဆက် (Spinosad)
၆။	မွှား Broad mite <i>Polyphagotarsonemus</i>	(၁) ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများကိုစိုက်ပျိုးပါ။ (၂) ဖျက်ပိုးကျရောက်နေသောကွင်းမှအပင်အစိတ်အပိုင်းများ အား အခြားကွင်းသို့ သယ်ဆောင် သွားခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။

	<i>latus</i> (Banks, 1904) Trombidifomes :Tarsonemidae	(၃) စိုက်ခင်းအနီးရှိပေါင်းမြက်များအားရှင်းလင်းပါ။ (၄)သဘာဝမိတ်ဆွေပိုးများအားထိန်းသိမ်းပါ။ (၅)အရွက်များပေါ်သို့ရေအရှိန်ပြင်းပြင်းဖျန်းပေးပါ။ (၅)ရေသွင်းခြင်းနှင့်မြေဩဇာမျှတစွာထည့်သွင်းခြင်းအား ပုံမှန်ပြုလုပ်ပါ။ (၆)ဆိုးရွားစွာ ကျရောက်ပါက ပင်လုံးပြန့် အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ် ဆေးတစ်မျိုးမျိုးကို ဆေးအညွှန်းစာအ တိုင်း ပက် ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate) • စပီရိုတတ်ထရာမက် (Spirotetramat) • အဘာမက်တင်(Abamectin) • အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုရိတ်(Emamectin Benzoate)
--	---	---

ငရုတ်တွင်ကျရောက်သောရောဂါများနှင့်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

“ငရုတ်” သီးနှံ တွင်ကျရောက်တတ်သောရောဂါများကို ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း

- ရောဂါခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။
- ရောဂါကင်းသော စိုက်ခင်းမှမျိုးစေ့ကိုရွေးချယ်ပါ။
- ရောဂါကင်းသော မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ကိုရွေးချယ်ပါ။
- မစိုက်ပျိုးမီ မျိုးစေ့များကို မျိုးစေ့လူးနယ်မှုသတ်ဆေး တစ်မျိုး မျိုး ဖြင့် လူးနယ်ပြီး စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါကျပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို ဖျက်ဆီးပစ်ပါ။
- သီးနှံရိတ်သိမ်းပြီးပါက ထယ်ထိုးမြေလှန်ပေးပါ။
- စိုက်ခင်းအတွင်းအလေ့ကျပေါက်နေသော ငရုတ်ပင်များကို ဖျက်ဆီးပစ်ပါ။
- ပေါင်းမြက်နှိမ်နင်းပါ။
- စိုက်ခင်းအတွင်းရေမဝပ်စေရန် (ရေသွင်း/ရေထုတ်မြောင်းများ) ဆောင်ရွက်ပေးပါ။
- မြေဆောင်မှုရောဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်အတွက် ထရိုင်ဂိုဒီးမား မှိုသတ်ဆေးကို မြေပြင်စဉ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ။
- သီးနှံပင်အတွက် လိုအပ်သော အာဟာရဓါတ်ပြည့်စုံအောင်ထည့်သွင်းပါ။
- သဘာဝမြေဩဇာနှင့် ဓါတ်မြေဩဇာ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုပါ။
- ရောဂါကျရောက်ပါက ရောဂါသတ်ဆေးကို အချိန်မီ အသုံးပြုပက်ဖျန်းပါ။
- ရောဂါသတ်ဆေးများကို (အာနီသင်ရှိုပစ္စည်း/အဆိပ်ရှိုပစ္စည်း) တစ်မျိုးထဲ ဆက်တိုက်မသုံးဘဲ အလှည့်ကျ အသုံးပြုပါ။
- ရောဂါပြင်းထန်စွာကျရောက်ပါက အခြားသီးနှံပင်များနှင့် သီးလှည့်စိုက်ပါ။

(၁) ငရုတ် မှဲ့ပြောက်စွန်းရောဂါ (သို့) ကိုင်းဖျားခြောက်ရောဂါ(သို့) သီးပုပ်ရောဂါ

(Anthracnose/Dieback/Fruit rot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ- *Colletotrichum capsici* (Syd.) E.J. Butler & Bisby

ရောဂါလက္ခဏာများ

ငရုတ်ပွင့်များ ညှိုးနွမ်းငိုက်ကျလာပြီး တဖြည်းဖြည်းခြောက်၍ ကြွေကျသည်။ ငရုတ် ကိုင်းများသည် ထိပ်ဖျားမှစ၍ ခြောက်လာပြီး ကိုင်းဆုံကိုင်းခွအထိ ခြောက်သွားသည်။ အသီး ပေါ်တွင် ရေစိုနာကွက်ငယ်(သို့) နီညိုရောင်အနာကွက်များတွေ့ရသည်။ အနာကွက် ပေါ်တွင် အမည်းစက်အဖုလေးများကို ဗဟိုတူစက်ဝိုင်း ရစ်များကဲ့သို့ တွေ့ရသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ရောဂါကင်းသော စိုက်ခင်းမှ မျိုးစေ့ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါရပင်ကြွင်း ပင်ကျန်များကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါ။
- လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်အောင် စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါလက္ခဏာတွေ့ရသော ငရုတ်သီးများအား ခူးဆွတ် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါ။
- ရောဂါကျရောက်လေ့ရှိပါက ငရုတ်ပန်းမပွင့်မီတစ်ကြိမ်နှင့် သီးကင်း ဝင်စတွင် တစ်ကြိမ် မှီသတ် ဆေးပက်ဖျန်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
- အောက်ပါမှီသတ်ဆေးများကို ပက်ဖျန်းအသုံးပြုပါ။
 - Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)
 - Mancozeb (မန်ကိုဇက်)
 - Azoxystrobin (အဆိုဆီစထရိုဘင်)
 - Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိတ်မီသိုင်း)
 - Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး)
 - Trifloxystrobin (ထရိုင်ဖလောက်ဆီစထရိုဘင်)

(၂) ဘက်တီးရီးယားပင်ညှိုးရောဂါ (Bacterial wilt)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ- *Ralstonia solanacearum* race 1 (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996

ရောဂါလက္ခဏာများ

အပင်ကြီးများတွင် အောက်ရွက်မှလည်းကောင်း၊ အပင်ငယ်များတွင် အပေါ်ရွက်မှ လည်းကောင်းစတင်ညှိုးသည်။ အရွက်ဝါခြင်းမရှိဘဲတစ်ပင်လုံးညှိုးသည်။ ပင်စည် အောက်ပိုင်း အစာရေကြောစည်းနှင့်အမြစ်တို့အရောင်ပြောင်းလဲနေသည်။ မြေပြင်နှင့်ကပ်

လျှက်အပိုင်းကို ဖြတ်၍ ရေထဲနှစ်ကြည့်ပါ က နွားနို့နှစ်ရောင် ဘက်တီးရီးယား စိမ့်ထုတ်ရည် များထွက်ရှိသည်ကို မြင်နိုင်သည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ရောဂါသည် သီးနှံစိုက်ရာသီဆက်တိုက်ကျပါက ငရုတ်၊ ခရမ်းချဉ်၊ အာလူး မဟုတ်သောအခြားသီးနှံများနှင့်အလှည့်ကျစိုက်ပျိုးပါ။
- ပေါင်းမြက်များရှင်းလင်းပါ။
- မြေကို နွေထယ်ရေးခံ၍ စိုက်ပါ။
- စိုက်ခင်းများ၊ စိုက်ဘောင်များတွင် ရေများခြင်း၊ ရေဝပ်ခြင်းမရှိစေရန် အထူး ဂရု ပြုပါ။
- စိုက်ခင်းအတွင်း ရေမဝပ်စေရန် ရေနုတ်မြောင်းများ စနစ်တကျလုပ်ထားပါ။
- စိုက်ခင်းမြေတွင် နီမတုတ်များရှိခြင်းသည် ဘက်တီးရီးယားပင်ညှိုးရောဂါကို ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။

(၃) ပင်စည်ပုပ်၊ သီးပုပ်ရောဂါ (Stem rot/ Fruit rot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ- *Phytophthora capsici* Leonian

ရောဂါလက္ခဏာများ

အပင်ငယ်စဉ်တွင် ရောဂါကျရောက်ပါက မြေပြင်နှင့် ထိစပ်နေသောပင်စည်တွင် အနာကွက်ဖြစ်ပေါ်ကာ မှိုမျှင်များတစ်ပတ်ရစ်သွားပြီး ပင်စည် အားနည်းလာကာ နောက်ဆုံး ကျိုးကျသွားသည်။ အပင်ကြီး၏ ပင်စည်နှင့်အကိုင်းများတွင် ပုံမမှန်သော ညိုမဲရောင် အကွက်များ တွေ့ရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ခြောက်၍သေသွားသည်။ အသီးတွင် ရောဂါကျ ရောက်ပါ က အသီးတစ်ခုလုံးရှုံ့တွပြီး ခြောက်သွားသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- စိုက်ခင်းအားရေမဝပ်စေရန်ဆောင်ရွက်ပါ။
- ရောဂါလက္ခဏာတွေ့ရသော ငရုတ်သီးများအား ခူးဆွတ် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါ။
- ပျိုးပင်များအား ပင်လုံးပြန့် အာနိသင်ရှိသော Azoxystrobin (အဇီဆိုစထရိုဘင်)၊ Metalaxyl (မီတယ်လဆီ) မှိုသတ်ဆေးဖျော်ရည်တွင် ခဏနှစ်ပြီး မှစိုက်ပျိုးပါ။

- ရောဂါကျရောက်ပါက Azoxystrobin (အဇိုဆီစထရိုဘင်)၊ Metalaxyl (မီတယ်လဆီ)၊ Fosetyl-AL (ဖေါ့စတိုင်းအေအယ်လ်)၊ Captan (ကက်ပ်တန်)၊ Propamocarb Hydrochloride (ပရိုပါမိုကပ်ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုဒ်) ဆေးများကို တစ်ပင်လုံး ရွဲရွဲ ဖျန်း ပေးပါ။

(၄) ခါးရိုရောဂါ (Damping-off)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ- *Pythium aphanidermatum* (Edson) Fitzp.

ရောဂါလက္ခဏာများ

ပျိုးပင်ပေါက်များနှင့် အပင်ငယ်များ၏ မြေပြင်နှင့် ထိစပ်သောနေရာတွင် ရေစိုနာ ကွက်ဖြစ် ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်း ခါးရိုလာကာအပင်ယိုင်လဲသည်။ တစ်ချို့အပင်များမှာ မြေပေါ်သို့ ပေါ်ထွက် မလာမီသေသွားသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ပျိုးခင်းများ၊ စိုက်ခင်းများတွင် ရေမဝပ်စေရန်၊ မြေကျပ်ခြင်းမဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ပါ။
- ပျိုးပင်များအား ပင်လုံးပြန့် အာနိသင်ရှိသော Azoxystrobin (အဇိုဆီစထရိုဘင်)၊ Metalaxyl (မီတယ်လဆီ) မှိုသတ်ဆေးဖျော်ရည်တွင် ခဏနှစ်ပြီး မှစိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါစတင်ကျပါက Azoxystrobin (အဇိုဆီစထရိုဘင်)၊ Metalaxyl (မီတယ်လဆီ)၊ Captan (ကက်ပ်တန်)၊ Fosetyl-AL (ဖေါ့စတိုင်းအေအယ်လ်) ဆေးများကို အပင်နှင့် အပင်ခြေ ရင်းများသို့ ရွဲရွဲဖျန်း ပေးပါ။

(၅) ဖားမျက်စေ့ကွက်ရောဂါ (Frog eye)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Cercospora capsici* Heald & F.A. Wolf

ရောဂါလက္ခဏာများ

အရွက်ပေါ်တွင် စက်ဝိုင်းပုံ သို့မဟုတ် ဘဲဥပုံ အစက်အပြောက်များ ပေါ်လာပြီး ၎င်း

အစက်အပြောက်၏ အလယ်ဗဟိုသည် အရောင်ဖျော့ သို့မဟုတ် မီးခိုးရောင်/အဖြူရောင်ရှိ၍ အနားသတ်မှာ အညိုရောင် သို့မဟုတ် အနက်ရောင်ဖြစ်ကာ ဖားမျက်စေ့ကဲ့သို့ ပုံစံဖြစ်ပေါ်နေသည်။ ရောဂါပြင်းထန်လာသောအခါ အစက်အပြောက်များ ချိတ်ဆက်မိပြီး အရွက်များ ခြောက်သွေ့လာပြီး စိုက်ခင်းအတွင်း အစိုဓာတ်ကြာရှည်စွာ ရှိနေချိန်တွင် ထိခိုက်ခံရသော အရွက်များ အလွယ်တကူ ကြွေကျသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ရောဂါကင်းသော စိုက်ခင်းမှ မျိုးစေ့ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါရပင်ကြွင်း ပင်ကျန်များကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါ။
- လေဝင်လေထွက်ကောင်းမွန်အောင် အပင်များစိပ်စိပ်စိုက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
- စိုက်ခင်းအတွင်း ရေမဝပ်စေရန် ရေနုတ်မြောင်းများ စနစ်တကျလုပ်ထားပါ။
- ရောဂါခိုအောင်းနိုင်သော ပေါင်းမြက်များကိုရှင်းလင်းပါ။
- ရောဂါကျရောက်ပါက Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်), Mancozeb (မန်ကိုဇက်), Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိုတ်မီသိုင်း) ၊ Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး) စသောဆေးများအသုံးပြုပက်ဖျန်းနိုင်သည်။

(၆) ဖားဥမှိုရောဂါ (Powdery mildew)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Leveillula taurica* (Lév.) G. Arnaud

ရောဂါလက္ခဏာများ

အရွက်ပေါ်တွင် အစိမ်းဖျော့ရောင်၊ အဝါရောင်ရောဂါကွက်များအဖြစ် တွေ့ရသော်လည်း ရောဂါကွက် အောက်မျက်နှာပြင်တွင် အဖြူရောင်မှုများကို အကွက်လိုက်တွေ့ရသည်။ ရောဂါပြင်း ထန်ပါက အရွက်များ အပေါ်ဘက်သို့ တွန့်လိပ်သွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ခြောက်၍ ကြွေကျသည်။

ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ရောဂါကင်းသော စိုက်ခင်းမှ မျိုးစေ့ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးများကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို ဖယ်ရှားဖျက်ဆီးပါ။

- လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး နေရောင်ခြည် ကောင်းစွာရရှိစေရန် အပင်များကို စိပ်စိပ်မစိုက်ဘဲ စနစ်တကျ ပင်ကြား၊ တန်းကြား သတ်မှတ်အကွာအဝေးအတိုင်း စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါခိုအောင်းနိုင်သည့် စိုက်ခင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပေါင်းမြက်များအား ပုံမှန် ရှင်းလင်းပါ။
- ရောဂါရနေသော အရွက်များနှင့် အပင်ဟောင်းများကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှားပါ။
- ရောဂါကျရောက်ပါက အောက်ပါ မှိုသတ်ဆေးများဖြင့် ထိရောက်စွာကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။
 - Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး)
 - Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး)
 - Sulfur (ဆာလ်ဖာ)
 - Kresoxim - Methyl (ကရီဆိုဇင်မ်-မီသိုင်း)
 - Trifloxystrobin (ထရိုင်ဖလောက်ဆီစထရိုဘင်)

ငရုတ်သီးနှံစိုက်ခင်းများတွင်ပေါင်းပေါက်ရောက်မှုအပေါ် ကြိုတင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

ငရုတ်သီးနှံသည် စိုက်ပျိုးပြီး ကနဦး ရက် ၃၀ မှ ၆၀ အတွင်း ပေါင်းယှဉ်ပြိုင်မှုကို အလွန်ခံရလွယ်ပါသည်။ ထိုကာလအတွင်း ပေါက်ရောက်သောပေါင်းများကို မနှိမ်နင်းပါက အထွက်နှုန်းကို ၃၀% မှ ၈၀% အထိလျော့ကျစေသည့်အပြင်ဖျက်ပိုးနှင့်ရောဂါများခိုအောင်းရာနေရာဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပေါင်း သတ်ဆေးများကို စနစ်တကျ မသုံးစွဲပါက သီးနှံတွင် ဓာတုဓာတ်ကြွင်း (Herbicide Residue) ကျန်ရှိပြီး စားသုံးသူဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပို့ကုန်ဈေးကွက် ပိတ်ပင်မှုများ ကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။

၁။ ငရုတ်စိုက်ခင်းများတွင် အဓိက ပေါက်ရောက်တတ်သော ပေါင်းများ

- **မြက်မျိုးရင်းဝင် ပေါင်းများ (Grassy Weeds):** မြက်သီး၊ မြက်ချို၊ ဝါးရုံမြက်၊ ဆင်ငိုမြက် ။
- **ရွက်ပြန့်ပေါင်းများ (Broadleaf Weeds):** ကြက်မောက်၊ တပင်ရွှေထီး၊ မြင်းခွာပေါင်း၊ ဟင်းနုနယ်ဆူးပေါက်။
- **မြက်မုန်ညင်းပေါင်းများ (Sedges):** မြက်မုန်ညင်းဥနက်။

၂။ ဘက်စုံပေါင်းကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးစနစ် (IWM)

၁။ စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့် ကာကွယ်ခြင်း (Cultural Control)

- **သီးလှည့်စိုက်ပျိုးခြင်း:** စိုက်ခင်းအတွင်း ပေါင်းပင်သံသရာကို ဖျက်ဆီးရန်အတွက် ငရုတ်သီးနှံ မဟုတ်သော အခြားသီးနှံများ (ဥပမာ- ပဲမျိုးနွယ်များ) နှင့် သီးလှည့်စိုက်ပါ။
- **မြေဖုံးခြင်း (Mulching):** မြေဖုံးပလတ်စတစ် (Plastic Mulch) သို့မဟုတ် ကောက်ရိုးဖုံးအုပ်စနစ်ကို သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ပေါင်းစေ့များ အလင်းရောင်မရဘဲ အပင်ပေါက်ရောက်မှုကို ထိရောက်စွာ တားဆီးနိုင်ပါသည်။
- **စိုက်အကွာအဝေး မှန်ကန်ခြင်း:** အပင်တန်းကြား၊ ပင်ကြား အကွာအဝေးကို စနစ်တကျစိုက်ပျိုး၍ အပင်အုပ်ဆိုင်မှု မြန်ဆန်စေခြင်းဖြင့် ပေါင်းမြက်များ အလင်းရောင်မရအောင် ကာကွယ်ပါ။

၂။ စက်ကိရိယာနှင့် အင်အားသုံး ရှင်းလင်းခြင်း (Mechanical & Physical Control)

- **ထွန်ယက်ပြင်ဆင်ခြင်း:** မစိုက်ပျိုးမီ မြေကို သေချာစွာ ထွန်ယက်ပေးခြင်းဖြင့် ပေါင်းစေ့များနှင့် ပေါင်းမြစ်/ပေါင်းဥများကို အောက်ခြေမှ ဖော်ထုတ်ဖျက်ဆီးပါ။
- **လက်ပေါင်းလိုက်ခြင်း:** သီးနှံပင်ငယ်စဉ် သီးနှံပင်နှင့် ကပ်နေသော ပေါင်းမြက်များကို လက်ပေါင်း လိုက်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းဆွဲကိရိယာများ သုံးစွဲ၍ ရှင်းလင်းပါ။

၃။ ဇီဝနည်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း (Biological Control)

- စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းပြီး ပေါင်းစေ့များကို စားသုံးသည့် အင်းဆက်များ၊ ငှက်များနှင့် အကျိုးပြုဇီဝသက်ရှိများကို မဖျက်ဆီးဘေးကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပါ။

၄။ **ဓာတုနည်းဖြင့် နှိမ်နင်းခြင်း (Chemical Control)** အပင်မပေါက်မီနှင့် အပင်ပေါက်ပြီးနောက် ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးများကို စနစ်တကျ ပက်ဖျန်းခြင်း။

ငရုတ်စိုက်ခင်းများတွင် ဓာတုဓာတ်ကြွင်း (Residue) ဘေးအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးစေရန်နှင့် စားသုံးသူ ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက် ပေါင်းသတ်ဆေးအမျိုးအစားအလိုက် စိတ်ချရသော PHI (Pre-Harvest Interval) စောင့်ဆိုင်းရမည့် ရက်များကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Active Ingredient (ပါဝင်သောဆေး)	ဆေးအမျိုးအစား/ ပက်ဖျန်းသည့်ကာလ	အဓိကနှိမ်နင်းနိုင်သည့် ပေါင်း	စောင့်ဆိုင်းရမည့် ရက် (PHI Days)	သတိပြုရန်
Pendimethalin (ပင်ဒီမီသလင်)	Pre-emergence (စိုက်ပျိုးမီ / ပျိုးမရွှေ့မီ)	မြက်နှင့် ရွက်ပြန့်ပေါင်းများ	၃၀ - ၄၅ ရက်	မစိုက်မီ သို့မဟုတ် စိုက်ပြီး ၁-၂ ရက် အတွင်းမြေစိုထိုင်းဆ ရှိချိန်ပက်ဖျန်းရမည်။
Oxyfluorfen (အောက်ဆီဖလူအိုဖီ)	Pre-emergence	ရွက်ပြန့်နှင့် မြက်အချို့	၄၅ ရက်	အပင်မစိုက်မီမြေပေါ် ပက်ဖျန်းရမည်။

Active Ingredient (ပါဝင်သောဆေး)	ဆေးအမျိုးအ စား/ပက်ဖျန်း သည့်ကာလ	အဓိကနှိမ်နင်းနိုင် သည့် ပေါင်း	စောင့်ဆိုင်းရမည့် ရက် (PHI Days)	သတိပြုရန်
ဖန်)	(စိုက်ပျိုးမီ မြေပြင်ချိန်)			ပျိုးပင်ငယ်များနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု မရှိစေရ။
Haloxypop-P- methyl (ဟောလော့ခ်မီဖော့)	Post- emergence (အပင်ပေါက်ပြီး ပေါင်း ၃-၅ ရက်)	မြက်မျိုးရင်းဝင် ပေါင်းများ	၂၁ - ၃၀ ရက်	ပေါင်းအပင်ငယ်စဉ် ဖျန်းပါကပိုမိုထိ ရောက်သည်။
Quizalofop-P- ethyl (ကွစ်ဇာလိုဖော့)	Post- emergence (အပင်ပေါက်ပြီး ပေါင်း ၃-၅ ရက်)	မြက်မျိုးရင်းဝင် ပေါင်းများ	၃၀ - ၄၅ ရက်	မြက်များကိုရွေးချယ် သတ်ပေးသည့် ဆေးဖြစ်ပါသည်။
Fluazifop-P-butyl (ဖလူအာဇီဖော့)	Post- emergence (အပင်ပေါက်ပြီး ပေါင်း ၃-၅ ရက်)	မြက်မျိုးရင်းဝင် ပေါင်းများ	၃၀ - ၄၀ ရက်	မြက်များကောင်းစွာ ကြီးထွားချိန်တွင် ပက်ဖျန်းနိုင်သည်။

ဓာတုဓာတ်ကြွင်း ကင်းဝေးရေး တောင်သူများအတွက် အရေးကြီးအချက်များ

- **Pre-emergence (အပင်မပေါက်မီဆေးများ):** သီးနှံစိုက်ပျိုးစဉ် ကနဦးကာလတွင်သာ သုံးစွဲခြင်း ဖြစ်၍ ရိတ်သိမ်းချိန်နှင့် ကွာဝေးသဖြင့် PHI ပြဿနာနည်းပါးသော်လည်း သတ်မှတ်နှုန်းထား ထက် ပိုမသုံးရပါ။
- **Post-emergence (အပင်ပေါက်ပြီးမှဖျန်းသည့်ဆေးများ):** အဓိက ရိတ်သိမ်းချိန်နီးကပ်မှ ဖျန်းမိ ပါက ဓာတ်ကြွင်းကျန်နိုင်ချေ အလွန်မြင့်မားပါသည်။ ငရုတ်သီး စတင်ခူးဆွတ်ချိန်နီးပါက PHI ရက်အတိအကျ မပြည့်မီ လုံးဝ (လုံးဝ) ခူးဆွတ်ရောင်းချခြင်း မပြုရပါ။

၅။ ဓာတုဓာတ်ကြွင်း (Residue) မကျန်ရှိစေရန် လိုက်နာရမည့် နည်းလမ်းများ

- **PHI အတိအကျ လိုက်နာပါ:** ဆေးဗူးခွံပါ PHI ရက်ပေါင်း (ဥပမာ- ၁၄ ရက် သို့မဟုတ် ၂၁ ရက်) မပြည့်မီ ငရုတ်သီး လုံးဝ မခူးဆွတ်ပါနှင့်။
- **ဆေးနှုန်းထား မပိုပါနှင့်:** သတ်မှတ်ထားသော ပက်ဖျန်းနှုန်းထား (Dosage) အတိုင်းသာ တိကျစွာ သုံးစွဲပါ။ ဆေးနှုန်းထား ပိုမိုသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဓာတ်ကြွင်း ပိုမိုကျန်ရှိစေသည်။
- **ဆေးဖျန်းကိရိယာများ စနစ်တကျသုံးပါ:** နော်ဇယ် (Nozzle) မှန်ကန်စွာ သုံး၍ပက်ဖျန်းပါ။ ဆေးဖျန်းပြီးပါက ကိရိယာများကို သေချာစွာ ဆေးကြောပါ။
- **အပင်ပေါက်ပြီးနောက် ရွေးချယ်ဖျန်းပါ:** သီးနှံမခူးဆွတ်မီ ကာလအနီးတွင် ပေါင်းသတ်ဆေး ဖျန်းခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး လက်ပေါင်းလိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် မြေဖုံးခြင်းများဖြင့် သာ အစားထိုးပါ။