

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

စာအမှတ်၊ PPD-၀၁-၀၇/၂၀၂၅ (၃၁၈)

ရက်စွဲ ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၃ ရက်

အကြောင်းအရာ။ စပါးသီးနှံစိုက်ပျိုးမှုတွင်အရေးကြီးသော စပါးဖြုတ်ညှိပိုး၊ ဖြုတ်ကျောဖြူပိုးများကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်သတိပေးချက်(Early Warning) ထုတ်ပြန်ခြင်း။

- ၁။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာခြင်းကြောင့် စပါးသီးနှံစိုက်ခင်းများ၌ စုပ်စားပိုးများဖြစ်သော ဖြုတ်ညှိပိုး၊ ဖြုတ်ကျောဖြူပိုးများ အချိန်မရွေး ကျရောက်လာနိုင်ပါသည်။
- ၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များအတွင်း စိုက်ပျိုးထားရှိသော စပါးသီးနှံစိုက်ခင်းများတွင် စပါးဖြုတ်ညှိပိုး၊ ဖြုတ်ကျောဖြူပိုးများ ကျရောက်နိုင်ပါသဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရေးအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်သော နည်းလမ်းများအား အချိန်မီဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကြိုတင်သတိပေးချက် (Early Warning) ပေးပို့ခြင်းနှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်မှုများ ရှိပါက သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ (ရုံးချုပ်)သို့ ချက်ချင်း သတင်းပို့ရန်အကြောင်းကြားပါသည်။

(ဇော်လင်း)

ညွှန်ကြားရေးမှူး

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး(.....)

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန။

မိတ္တူကို

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ရုံးခန်း)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(နည်းပညာ)၊ (တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
ရုံးလက်ခံ


ဖြတ်ညိုပိုး၊ဖြတ်ကျောဖြူပိုး

ကျရောက်သည့်အချိန်

ပျိုးခင်းမှ အနှံ့တည်စအချိန်အထိကျရောက်နိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတုနှင့် ဆက်စပ်မှုအများဆုံးရှိသော ဖျက်ပိုးဖြစ်ပါသည်။

ဖျက်ဆီးပုံလက္ခဏာ

ဖြတ်ညိုနှင့်ဖြတ်ကျောဖြူပိုးများကျရောက်ပါက စပါးပင်၏ပင်ရည်အား စုပ်ယူသဖြင့် စပါးရွက် များ ခြောက်သွေ့ ကာ မီးလောင်ထားသကဲ့သို့ တွေ့မြင်ရပြီး နောက်ဆုံးတွင် အပင်များ အားလုံး သေသွားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ

- (၁) မီးထောင် ချောက် (Light Trap) များအသုံးပြု၍ ဖြုတ်ညှိ/ဖြုတ်ကျောဖြူများပိုးကျရောက်မှု၊ အားကြိုတင်ကင်းထောက်မှတ်တမ်းကောက်ယူပါ။
- (ဖြုတ်ပိုးများကျရောက်မှုများလာပါက စိုက်ခင်းဘေးပတ်လည်တွင် မီးထောင်ချောက်များ တစ်ကွင်း တစ်စပ်တည်းထွန်းပါ)
- (၂) ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ပေါင်းမြက်များမရှိစေရ။ အထူးသဖြင့် ဖြုတ်ညှိပိုးများ၏ လက်ခံ ပင်ဖြစ်သော ဝမ်းဘဲစာမြက်နှင့် မြက်မုံညင်းများအားဖယ်ရှားပါ။
- (၃) ယခင်နှစ်ကဖြုတ်ညှိ/ဖြုတ်ကျောဖြူပိုးကျခဲ့သောစိုက်ခင်းကိုမီးရှို့၍ ထယ်ရေး နက်နက် ထိုးပါ။
- (၄) လယ်ကွင်းသို့ ရေဆက်တိုက်သွင်းပေးခြင်းမှာ ဖြုတ်ညှိ/ဖြုတ်ကျောဖြူ ပိုးကျရောက်မှုများ စေသဖြင့် ရေထုတ် ရေသွင်းပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ။
- (၅) လေလမ်းကြောင်းခွဲပါ။
- (၆) ဓာတ်မြေဩဇာ (ယူရီးယား) အားသင့်တော်သောနှုန်းထားဖြင့်ထည့်သွင်းပေးပါ။
- (၇) ပိုတတ်ရှ်မြေဩဇာ အားတစ်ဧကလျှင်(၁/၄)အိတ်မဖြစ်မနေ မှန်မှန်ထည့်ပေးပါ။
- (၈) စပါးပင်အုံတအုံတွင်ဖြုတ်ညှိ/ဖြုတ်ကျောဖြူပိုးအကောင်ဦးရေ (၁၀-၁၅) ကောင်တွေ့ပါက စပါး ကွင်းအား ရေထုတ်၍ ပင်လုံးပြန့်ပိုးသတ်ဆေးတမျိုးမျိုးဖျန်းပေးပါ။
- (၉) ပိုးသတ်ဆေးများသည် စပါးခင်းအတွင်းရှိ မိတ်ဆွေပိုးများဖြစ်သော (ပင့်ကူ၊ သားရဲ ကောင်များ၊ အကျိုးပြုနဂျီကောင်များ) အားသေစေနိုင်သဖြင့် ပိုးသတ် ဆေးဖျန်းရန် လိုအပ်ပါကမှန်ကန်သော ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားအား ရွေးချယ်၍ သင့်တော် သောနှုန်းထားဖြင့် အချိန်ကိုက်ဖြုတ်ညှိ/ဖြုတ်ကျောဖြူပိုးနေထိုင်ရာ အပင်ခြေရောက်အောင် ပက်ဖျန်း ပေးပါ။

(၁၀) မိတ်ဆွေပိုးများလာရောက်စေရန် စပါးစိုက်ခင်းများ၊ ကန်သင်းများတွင် အဝါရောင်နှင့် အဖြူရောင်ပန်းပွင့်သည့် အပင်များစိုက်ပျိုးပေးပါ။

(၁၁) ဖြုတ်ညှိပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသောစပါးမျိုးများဖြင့် အစားထိုးစိုက်ပျိုးပေးပါ။

အသုံးပြုသင့်သောပိုးသတ်ဆေးများ

- ဖီနိုဗျူကတ် (Fenobucarb)
- ဒိုင်နိုတီဖျူရန် (Dinotefuran)
- ဒိုင်မီသိုရိတ် (Dimethoate)
- ကာဘိုဆာလဖန် (Carbofufan)
- သိုင်ရာမီသိုဇမ် (Thiamethoxam)
- ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
- နိုင်းတန်ပိုင်ရန် + ပိုင်မီထရိုဇင်း (Nitenpyram + Pymetrozine)

မှတ်ချက်။ ။ (၁) ပိုးသတ်ဆေးယဉ်ပါးမှုများ မဖြစ်ပေါ်စေရန် မတူညီသော ဆေးအုပ်စု များ အား အလှည့်ကျသုံးစွဲရန် လိုအပ်ပါသည်။

(၂) ဆိုင်ပါမီသရင်(Cypermethrin)၊ ဒယ်လ်တာမီသရင် (Deltamethrin)၊ လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင်(Lambda- cyhalothrin)၊ ဘိုင်ဖန်သရင် (Bifenthrin)၊ အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုရိတ် (Emamectin Benzoate) ၊ ကလိုပိုင်ရီဖော့စ် (Chlorpyrifos) (တားမြစ် ပိုးသတ်ဆေး)များသည် Resurgence ဖြစ်စေခြင်း (ဖြုတ်ပိုးဦးရေ ပိုမိုပွားများစေခြင်း)ကြောင့်လုံးဝအသုံးမပြုပါ နှင့်။