

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
သီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ

စာအမှတ်၊ PPD-၀၁ / ၂၀၂၆ (၀၁၅)

ရက်စွဲ ၂၀၂၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်

အကြောင်းအရာ။ ။ ပိုးမွှား/ရောဂါ/ပေါင်း ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် သတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း။

၁။ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများရှိ နွေရာသီသီးနှံစိုက်ခင်းများ၌ ပိုးမွှား/ ရောဂါ/ပေါင်း များ အချိန်မရွေး ကျရောက်လာနိုင်ပါသည်။

၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ မိမိတို့၏ ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများအတွင်း စိုက်ပျိုးထားရှိသော သီးနှံ စိုက်ခင်းများတွင် ပိုးမွှား/ရောဂါ/ပေါင်း ကျရောက်ခြင်းကြောင့် ပျက်ဆီး ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန် အတွက် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရမည့် ဖျက်ပိုးကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး နည်းလမ်း များအား လုပ်ဆောင် နိုင်ရန် သတိပေး ချက်ပေးပို့ခြင်းနှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်မှုများရှိပါကသီးနှံကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ(ရုံးချုပ်)သို့ချက်ချင်း သတင်းပို့ရန် အကြောင်းကြားပါသည်။

(ဇော်လင်း)

ညွှန်ကြားရေးမှူး



တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး(.....)

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန။

မိတ္တူကို -

ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(ရုံးခန်း)၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(နည်းပညာ/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်/စီမံခန့်ခွဲမှုကိန်း၊ ငွေစာရင်း)၊

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

ရုံးလက်ခံ။

**နွေရာသီအရေးကြီးသီးနှံများတွင်ကျရောက်တတ်သောဖျက်ပိုးများနှင့်
ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ**

စဉ်	ဖျက်ပိုး	ဘက်စုံကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလမ်းများ
စပါး		
၁။	ဆစ်ပိုး Yellow Stemborer, <i>Scirphophaga incertulus</i> (Walker, 1863)	မြေပြင်ချိန်တွင်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (၁) ရိုးပြတ်များနှင့်ကောက်ရိုးများအားမီးရှို့ပါ။ (၂) ထယ်ရေးနက်နက်ထိုးပြီးရေသွင်းထားပါ။ (၃)မြေပြင်ချိန်တွင်ကာတက်ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက် ၄ဂျီ (Cartap hydrochloride 4G) ထည့်ပါ။ တိုက်ရိုက်(သို့) ပြောင်းရွှေ့စိုက်ချိန်တွင်ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ (၁) ဆစ်ပိုးဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော စပါးမျိုးများအားစိုက်ပျိုးပါ။ (ဆင်းသုခ၊ ရတနာတိုး) (၂) ပျိုးခင်းတွင်ဆစ်ပိုးဥမြုံများတွေ့ရသော အရွက်အစိတ်အပိုင်းများ အားဖြတ်ပြီးမှသာရွှေ့ပြောင်းစိုက်ပါ။ (၃) စိုက်ခင်းဘေးပတ်လည်တွင်မီးထောင်ချောက်များတစ်ကွင်း တစပ်တည်းထွန်းပါ။ (၄) ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာ တစ်ဧကလျှင် (၁/၄)အိတ်ထည့်ပါ။ (၅) Trichogramma ဥကပ်များအသုံးပြုနှိမ်နင်းပါ။ (၆)ခေါင်ညွန့်သေခြင်းလက္ခဏာများတွေ့ရပါက ထိသေ၊စားသေ(သို့) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေး များ အား ဆေးအညွှန်းအတိုင်း အချိန်မှီ ထိထိမိမိပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • ကလိုထရန်နီလီပရော (Chlorantraniliprole) • ကာတက်ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက် (Cartap hydrochloride) • ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
၂။	ဖြူတည့် Brown planthopper ,	(၁) စိုက်ခင်းဘေးပတ်လည်တွင်မီးထောင်ချောက်များတစ်ကွင်း တစပ်တည်းထွန်းပါ။ (၂)စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပေါင်းမြက်များနှင့်လမိုင်းများရှင်းလင်းပါ။

	<i>Nilaparvata lugens</i> (Stål, 1854) ဖြူတံကျောဖြူ White-backed planthopper, <i>Sogatella furcifera</i> (Horváth, 1899)	(၃) ရေသွင်းရေထုတ် ပြုလုပ်နိုင်သောစိုက်ခင်းများတွင် (၃) ရက်ခန့် ရေထုတ်ပါ။ (၄) လေလမ်းကြောင်းခွဲပါ။ (၅) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးများအားဆေးညှန်းအတိုင်းအပင်ခြေရောက် အောင်နှံနှံစပ်စပ် ပက်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်နိုတီဖျူရန် (Dinotefuran) • ဒိုင်မီသိုရိတ် (Dimethoate) • ဖီနိုဗျူကတ် (Fenobucarb) • ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil) • နိုင်တန်ပိုင်ရန် + ပိုင်မီထရိုဇင်း (Nitenpyram + Pymetrozine) မှတ်ချက် • ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin) • ဒယ်လ်တာမီသရင် (Deltamethrin) • လန်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin) • ဘိုင်ဖန်သရင် (Bifenthrin) • အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုရိတ် (Emamectin Benzoate) • ကလိုပိုင်ရီဖော့စ် (Chlorpyrifos) (တားမြစ် ပိုးသတ်ဆေး) များသည် Resurgence (ဖျက်ပိုး ဦးရေ ပိုမိုပွား များစေခြင်း) တို့ကြောင့် အသုံးမပြုပါနှင့်။
၃။	cမြောင်တောင် Armyworm <i>Spodoptera mauritia</i>, (Boisduval, 1833)	(၁) စိုက်ခင်းဘေးပတ်လည်တွင် မီးထောင်ချောက်များ တစ်ကွင်းတစ်ကွင်း ထွန်းပါ။ (၂) စိုက်ခင်းတစ်ကွက်မှ တစ်ကွက်မကူးနိုင်ရန် (၁-၂)ပေခန့် အကျယ် မြောင်းများတူး၍ မြောင်းအတွင်းကျနေသော ပိုးလောက် ကောင်များအား ရှာဖွေဖျက်ဆီးပါ။ (၃) ထိသေစားသေ(သို့)ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးများအား ဆေးညှန်းအတိုင်းညနေပိုင်းတွင်ပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • ကလိုရန်ထရန်နီလီပရို (Chlorantraniliprole) • ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin)
၄။	လှေးပိုး	(၁) အပြာရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်အားတစ်ဧကလျှင် (၃-၅)ခုအသုံး

	Thrips, <i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913)	ပြု ဖမ်းယူပါ။ (၂) မီးခိုးမှိုင်းတိုက်ပါ။ (၃)ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးများအား ဆေး အညွှန်း အတိုင်း နံနံ့ စပ်စပ် အလှည့်ကျ ပက်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)၊ • အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid) • ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran) • စပီရိုတက်ထရာမက်(Spirotetramat) • ကလိုဖီနာပြာ(Chlofenapyr)
ဆီထွက်သီးနှံများ		
၁။	ယင်ဖြူ Whitefly, <i>Bamisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	(၁) လက်ခံပင်များဖြစ်သော ပေါင်းမြက်နှင့် ပဲမျိုးရင်းဝင်အပင်များအား ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပါ။ (၂) ပင်ကြွင်းပင်ကျန် အမှိုက်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။ (၃) သီးလှည့်စိုက်ပါ။ (ပဲသီးနှံတစ်မျိုးတည်း ဆက်တိုက်စိုက်ခြင်းအား ရှောင်ကြဉ်ပါ) (၄) အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်အားတစ်ဧကလျှင်(၃-၅)ခု အသုံးပြု ဖမ်းယူပါ။ (၅)ယင်ဖြူမှထုတ်သောဖယောင်းလွှာများအားအရည်ပျော်စေရန်ဆပ်ပြာ ဖျော်ရည်အားအရွက်အောက်မျက်နှာပြင်ရောက်အောင်ပက်ဖျန်းပါ။ (၆) မစိုက်မီမျိုးစေ့အားအီမီဒါကလိုပရစ်(Imidacloprid 600FS/70SS) ဆေးများဖြင့်အညွှန်း အတိုင်း လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။ (၇) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေး များအား ဆေးအညွှန်းအတိုင်း အရွက် အောက် မျက်နှာ ပြင် ရောက်အောင်နံနံ့ စပ်စပ်အလှည့်ကျ ပက်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate) • အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid) • ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran) • စပီရိုတက်ထရာမက်(Spirotetramat) • စပီရိုမက်စီဖန် (Spiromesifen)

၂။	ပျဉ်း Aphid, <i>Aphis gossypii</i> (Glover, 1877)	(၁)စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိပေါင်းမြက်များအားရှင်းလင်းပါ။ (၂) မီးခိုးမှိုင်းတိုက်ပေးပါ။ (၃) အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်အားတစ်ဧကလျှင် (၃-၅) ခု အသုံးပြုဖမ်းယူပါ။ (၄) မစိုက်မီမျိုးစေ့အားအီမီဒါကလိုပရစ်(Imidacloprid 600FS/70SS) ဆေးများဖြင့်အညွှန်း အတိုင်း လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။ (၅) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေး များအား ဆေးအညွှန်းအတိုင်း အရွက် အောက် မျက်နှာ ပြင် ရောက်အောင်နှံ့ စပ်စပ်အလှည့်ကျ ပတ်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate) • အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid) • ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran) • ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)
၃။	လှေးပိုး Thrip, <i>Thrips palmi</i> (Karny, 1925)	(၁)အပြာရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်အားတစ်ဧကလျှင်(၃-၅)ခုအသုံးပြုဖမ်းယူပါ။ (၂) မီးခိုးမှိုင်းတိုက်ပါ။ (၃)ရေဖျန်းပါ။ (၄)ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးများအား ဆေးအညွှန်းအတိုင်း နှံ့စပ်စပ် အလှည့်ကျ ပတ်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)၊ • အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid) • ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran) • စပီရိုတက်ထရာမက်(Spirotetramat) • ကလိုဖီနာပြာ(Chlofenapyr)
၄။	နှမ်းဖြုတ်ညို Jassid/Leafhopper, <i>Orosiusalbicinctus</i> (Distant.)	(၁)စိုက်ခင်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပေါင်းမြက်များကို ရှင်းလင်းပါ။ (၂)သီးလှည့်စိုက်ပျိုးပါ။ (၃)အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်အားတစ်ဧကလျှင်(၃-၅)ခုအသုံးပြုဖမ်းယူပါ။ (၄) မစိုက်မီမျိုးစေ့အားအီမီဒါကလိုပရစ်(Imidacloprid 600FS/70SS) ဆေးများဖြင့်အညွှန်း အတိုင်း လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။

		(၅)ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးများအားဆေးအညွှန်းအတိုင်း အရွက်အောက်မျက်နှာ ပြင် ရောက်အောင်နှံ့စပ်စပ် အလှည့်ကျ ပက်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate) • အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid) • ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran)
၅။	နှမ်းရွက်လိပ်ပိုး Sesamum Leaf roller <i>Antigastia catalaunalis</i> (Walker, 1859)	(၁) ပိုးကျသောအရွက်များကို ဖယ်ရှားမီးရှို့ပါ။ (၂) ထိသေ၊ စားသေအာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးများ အားဆေး အညွှန်း အတိုင်း အရွက်လိပ် အတွင်းရောက်အောင်ပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • ကလိုရန်ထရန်နီလီပရိုး (Chlorantraniliprole) • လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)
၆။	ရွက်စုံစားခုဝါ Common Hairy Catnipillar <i>Spilosoma obliqua</i> (Walker, 1855)	(၁) အရွက်ပေါ်တွင် ဥ အစုလိုက်တွေ့ပါက ဖျက်ဆီးပါ။ (၂) ထိသေ၊ စားသေအာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးများ အားဆေး အညွှန်း အတိုင်း အရွက်လိပ် အတွင်းရောက်အောင်ပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin) • လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)
၇။	ငမြောင်တောင် Armyworm, <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius, 1775)	(၁)မီးထောင်ချောက်များတစ်ကွင်းတစပ်တည်းထွန်းပါ။ (၂)စိုက်ခင်းတစ်ကွက်မှ တစ်ကွက်မကူးနိုင်ရန် (၁-၂)ပေအကျယ် မြောင်း တူး၍ မြောင်းအတွင်း ကျနေသော ပိုးလောက်ကောင်များ ရှာဖွေ ဖျက် ဆီး ပါ။ (၃) အရွက်အောက်တွင်ရှိသော ဥအစုများ၊ အကောင်ငယ်များကို ဖျက်ဆီး ပစ်ပါ။ (၄) ထိသေ၊ စားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးများ အားဆေး အညွှန်း အတိုင်း ညနေပိုင်းတွင်ပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုရိတ်+ လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Emamectin benzoate + Lambda-cyhalothrin) • ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin)

ဟင်းသီးဟင်းရွက်		
၁။	ယင်ဖြူ Whitefly, <i>Bamisia tabaci</i> (Gennadius, 1889)	(၁) ပင်ကြွင်းပင်ကျန် အမှိုက်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။ (၂) အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်အားတစ်ဧကလျှင် (၃-၅)ခု အသုံးပြုဖမ်းယူပါ။ (၃) ယင်ဖြူမှထုတ်သောဖယောင်းလွှာများအားအရည်ပျော်စေရန် ဆပ်ပြာပျော်ရည်အားအရွက်အောက်မျက်နှာပြင်ရောက်အောင်ပက်ဖျန်းပါ။ (၄) မစိုက်မီမျိုးစေ့အားအီမီဒါကလိုပရစ် (Imidacloprid 600FS/70SS) ဆေးများဖြင့်အညွှန်း အတိုင်း လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။ (၅) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေး များကို ဆေး အညွှန်း အတိုင်း အရွက်အောက်မျက်နှာ ပြင် ရောက်အောင်နှံ့စပ်စပ် အလှည့်ကျ ပက်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate) • အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid) • ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran) • စပီရိုတက်ထရာမက် (Spirotetramat) • စပီရိုမက်စီဖန် (Spiromesifen)
၂။	ပျဉ်း Aphid, <i>Aphis craccivora</i> (Koch, 1854)	(၁) ပေါင်းမြက်များကိုရှင်းလင်းပါ။ (၂) မီးခိုးမှိုင်းတိုက်ပါ။ (၃) အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်အားတစ်ဧကလျှင် (၃-၅) ခု အသုံးပြုဖမ်းယူပါ။ (၄) မစိုက်မီမျိုးစေ့အားအီမီဒါကလိုပရစ် (Imidacloprid 600FS/70SS) ဆေးများဖြင့်အညွှန်း အတိုင်း လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။ (၅) ပင်လုံးပြန့်အာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးများအား ဆေး အညွှန်းအတိုင်း အရွက်အောက်မျက်နှာ ပြင် ရောက်အောင်နှံ့စပ်စပ် အလှည့်ကျ ပက်ဖျန်းပါ။ • ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate) • အဆီတာမီပရစ် (Acetamiprid) • ဒိုင်နိုတီဖျူရမ် (Dinotefuran) • ဖစ်ပရိုနေး (Fipronil)

၃။	cမြောင်တောင် Armyworm, <i>Spodoptera</i> <i>litura</i> (Fabricius, 1775)	(၁)မီးထောင်ချောက်များတစ်ကွင်းတစပ်တည်းထွန်းပါ။ (၂)စိုက်ခင်းတစ်ကွက်မှ တစ်ကွက်မကူးနိုင်ရန် (၁-၂)ပေအကျယ် မြောင်းများတူး၍ မြောင်းအတွင်း ကျနေသော ပိုးလောက်ကောင်များ ရှာဖွေဖျက်ဆီးပါ။ (၃) အရွက်အောက်တွင်ရှိသော ဥအစုများ၊ အကောင်ငယ်များကို ဖျက်ဆီးပါ။ (၄) ထိသေ၊ စားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးများ အား ဆေး အညွှန်း အတိုင်း ညနေပိုင်းတွင်ပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • ကလိုရန်ထရန်နီလီပရိုး (Chlorantraniliprole) • ဆိုင်ပါမီသရင် (Cypermethrin) • လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် (Lambda-cyhalothrin)
၄။	စိန်ကွက်ဖလံ Diamond Back Moth <i>Plutella</i> <i>xylostella</i> (Linnaeus, 1758)	(၁) အရွက်အောက်တွင်ရှိသော ဥအစုများ၊ အကောင်ငယ်များကို ဖျက်ဆီးပါ။ (၂)အဝါရောင်ပိုးဖမ်းထောင်ချောက်အားတစ်ဧကလျှင်(၃-၅)ခုအသုံးပြု ဖမ်းယူပါ။ (၃)အပင်အားရေအားပြင်းပြင်းဖြင့်နှံ့နှံ့စပ်စပ်ပက်ဖျန်းပါ။ (၃)ထိသေ၊ စားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးများ အား ဆေးအညွှန်း အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • ကလိုရန်ထရန်နီလီပရိုး (Chlorantraniliprole) • အင်ဒိုဇာကပ် (Indoxacarb) • လန်မ်ဒါဆိုင်ဟေလိုသရင် + အီမာမက်တင်ဘန်ဇိုအိတ် (Lambda-cyhalothrin + Emamectin benzoate)
၅။	ခရမ်းချဉ်ရွက် ထွင်းပိုး/သီးထိုး ပိုး Tomato leafminer/ pinworm,	(၁)မီးထောင်ချောက်ထွန်းပါ။ (၂)ထိသေ၊ စားသေအာနိသင်ရှိ ပိုးသတ်ဆေးများအား ဆေးအညွှန်း အတိုင်း ပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • အင်ဒိုဇာကပ် (Indoxacarb) • ကလိုရန်ထရန်နီလီပရိုး (Chlorantraniliprole)

	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick,1917)	• လူဖီညူရူန် (Lufenuron) • ကလိုဖီနာပြာ (Chlofenapyr) • ဘက်တီးရီးယား (<i>Bacillus thurigiensis</i>)
၆။	ခေါင်ညွန့်ထိုးပိုး Fruit and shoot borer, <i>Leucinodes</i> <i>orbonalis</i> (Guenée, 1854)	(၁) ခေါင်ညွန့်ဖြတ်ပေးပါ။ (၂) ထိသေ၊ စားသေ(သို့)ပင်လုံးပြန် အာနိသင်ရှိပိုးသတ်ဆေးများအား ဆေးညွှန်း အတိုင်းပက်ဖျန်းပါ။ • ဖလူဗန်ဒိုင်ရာမိုက် (Flubendiamide) • ကလိုရန်ထရန်နီလီပရိုး (Chlorantraniliprole) • အင်ဒိုဇာကပ် (Indoxacarb) • ပရိုဖီနိုဖော့စ် (Profenofos)

နွေစပါးအပါအဝင် အခြားဆီထွက်သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင်

ရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်နည်းလမ်းများ

နွေစပါးအပါအဝင် အခြားဆီထွက်သီးနှံများ စိုက်ပျိုးရာတွင်ရာသီဥတုပူနွေးပြီး သွင်းရေများကြောင့် သီးနှံပင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပူနွေးစွတ်စိုမှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကာ သီးနှံမှိုရောဂါများ နှင့် ဘက်တီးရီးယားများ ပေါက်ပွားမှုအားကောင်းပြီး စိုက်ပျိုးသီးနှံများတွင် ရောဂါများဆိုးရွားစွာ ဖြစ်ပေါ်စေကာ သီးနှံများအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အပင်ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန် နည်းလမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

- ဒေသအလိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးများအားရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါကင်းသော စိုက်ခင်း/မျိုးစေ့ကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- မျိုးစေ့များအား မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော မှိုသတ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လူးနယ်ပြီးမှ စိုက်ပျိုးပါ။
- အပင်စိပ်လွန်းစွာစိုက်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ပါ။
- ကောင်းစွာဆွေးမြေ့သော သဘာဝမြေဩဇာများကိုအသုံးပြုပါ။
- ဓါတ်မြေဩဇာများကို အချိုးညီသုံးစွဲပါ။
- ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရန် ပိုတက်ရှ် မြေဩဇာကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ။
- ယာသီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် ရေမဝပ်စေရန် ရေထုတ်မြောင်းများထားရှိပါ။
- စိုက်ခင်းအတွင်း ပေါင်းမြက်များ၊ ရောဂါကျပင်ကြွင်းပင်ကျန်များအား ဖျက်ဆီးပစ်ပါ။
မြေဆောင်မှိုရောဂါများအတွက် ထရိုင်ဂိုဒီးမားမှိုအား မြေပြင်စဉ်တွင် ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ။
- သီးနှံတစ်ရာသီပြီးဆုံးပါက စိုက်ခင်းကိုမြေလှုပ်ထားပါ။
- သီးနှံတစ်မျိုးကို နှစ်ကြာရှည်စွာဆက်တိုက်မစိုက်ဘဲ အခြားသီးနှံများနှင့် အလှည့် ကျသီးလှည့်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါကျရောက်မှုရှိ/မရှိ ပုံမှန်ကင်းထောက်ပါ။
- ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်လိုအပ်ပါက ရောဂါသတ်ဆေးကို အသုံးပြုပါ။
- ရောဂါသတ်ဆေးများကို တစ်မျိုးထဲ ဆက်တိုက်မသုံးပဲ အခြားဆေးများနှင့် အလှည့်ကျအသုံးပြုပါ။

- သီးနှံအလိုက် ကျရောက်နိုင်သော ရောဂါများနှင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများအား ယှဉ်တွဲဖော်ပြထားပါသည်။

စပါး

နွေစပါးများစိုက်ပျိုးရာတွင် ရာသီဥတု ပူနွေးပြီး သွင်းရေများကြောင့် သီးနှံပင် ပတ်ဝန်းကျင် တွင်ပူနွေးစွတ်စိုမှုများပိုမိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး စပါးသီးနှံမိုရောဂါများဖြစ်သော ဂုတ်ကျိုးရောဂါ၊ ရွက်ဖုံး ခြောက်ရောဂါ၊ ရွက်ညိုပြောက်ရောဂါ၊ ရွက်ညိုပြောက်ရှည်ရောဂါ၊ စပါးမိုသီးရောဂါများနှင့် စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်ရောဂါ၊ စပါးဘက်တီးရီးယား ရွက်စင်းရောဂါ၊ စပါးမြစ်ဖုနီမတုတ် ရောဂါများ ကျရောက်တတ်ပြီး စပါးအထွက်နှုန်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အပင်ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်နှိမ်နင်း ရန် နည်းလမ်းများအား လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

- ဒေသအလိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးများအားရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါကင်းသော စိုက်ခင်း/မျိုးစေ့ကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- မျိုးစေ့များအား မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေးအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သော မှိုသတ်ဆေး တစ်မျိုး မျိုးဖြင့် လူးနယ်ပြီးမှ စိုက်ပျိုးပါ။
- အပင်စိပ်လွန်းစွာစိုက်ခြင်းမှရှောင်ကျဉ်ပါ။
- ကောင်းစွာဆွေးမြေ့သော သဘာဝမြေဩဇာများကိုအသုံးပြုပါ။
- ဓါတ်မြေဩဇာများကို အချိုးညီသုံးစွဲပါ။
- ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ရန် ပိုတက်ရှ် မြေဩဇာကို မဖြစ်မနေ ထည့်သွင်းအသုံးပြုပါ။
- သီးနှံများစိုက်ပျိုးရာတွင် ရေမဝပ်စေရန် ရေထုတ်မြောင်းများထားရှိပါ။
- စိုက်ခင်းအတွင်း ပေါင်းမြက်များ၊ ရောဂါကျပင်ကြွင်းပင်ကျန်များအား ဖျက်ဆီးပစ်ပါ။
- သီးနှံတစ်ရာသီပြီးဆုံးပါက စိုက်ခင်းကိုမြေလှုပ်ထားပါ။
- ရောဂါကျရောက်မှုရှိ/မရှိ ပုံမှန်ကင်းထောက်ပါ။
- ကာကွယ်နှိမ်နင်းရန်လိုအပ်ပါက ရောဂါသတ်ဆေးကို အသုံးပြုပါ။
- ရောဂါသတ်ဆေးများကို တစ်မျိုးထဲ ဆက်တိုက်မသုံးပဲ အခြားဆေးများနှင့် အလှည့် ကျအသုံးပြုပါ။


စပါးတွင်ကျရောက်တတ်သောရောဂါများ

(၁) စပါးဂုတ်ကျိုးရောဂါ (Rice Blast)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Pyricularia oryzae*

ရောဂါလက္ခဏာများ

လွန်းပုံသဏ္ဌာန်၊ အလယ်တွင် မီးခိုး ရောင် ရှိ
သောအညိုရောင်အကွက်များဖြစ်ပေါ်သည်။
စပါးနှံ၏ အဆစ်တွင် အညိုရောင် အကွက်
ဖြစ်၍ ကျိုးကျသွားသည်။



(၂) စပါးရွက်ဖုံးခြောက်ရောဂါ (Sheath blight)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Rhizoctonia solani*

ရောဂါလက္ခဏာများ

ရွက်ပြားပေါ်တွင် ညိုနက်ရောင် အနားသတ်
ရှိသော မီးခိုးရောင်အနာကွက် ဖြစ်ပေါ်သည်။
ရွက်ဖုံးပေါ်တွင်လည်း ရောဂါအနာကွက်သည်
စိမ်းညိုရောင်ရှိ၍ လုံးရှည်ပုံ၊ ဘဲဥပုံအကွက်များ
ဖြစ်ပေါ်သည်။



(၃) စပါးရွက်ညိုပြောက်ရောဂါ (Brown spot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Helminthosporium oryzae*

ရောဂါလက္ခဏာများ

အလယ်တွင်မီးခိုးရောင်နှင့် အညိုရောင်အနား
ရစ်ရှိသော ဘဲဥပုံအညိုရောင်ရွက်ပြောက်များ
ညီညာစွာပြန့်ကြဲနေသည်။



(၄) စပါးရွက်ညိုပြောက်ရှည်ရောဂါ (Narrow brown spot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Cercospora oryzae*

ရောဂါလက္ခဏာများ

ရွက်ကြောများနှင့်အပြိုင် အလယ်တွင်အညို
ရင့်ရောင်သောသေးရှည်ရှည်အပြောက်များ ဖြစ်
ပေါ်သည်။ စပါးရွက်ကို အလင်းရောင် အောက်
ထောင်ကြည့်လျှင်၎င်းအပြောက်များမှာ အလင်း
မဖောက်နိုင်ပေ။



(၅) စပါးမှိုသီးရောဂါ (False smut)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Ustilaginoidea virens*

ရောဂါလက္ခဏာများ

စပါးနံ၊ စပါးစေ့များတွင် အစိမ်းရောင်၊ စိမ်းဝါရောင် မှိုအစုအခဲများ ဖုံးအုပ်ပြီးမှိုသီးများအဖြစ် တွေ့ရသည်။



(၆) စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်ရောဂါ (Rice Bacterial leaf blight)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzae*

ရောဂါလက္ခဏာများ

ရွက်ဖျား၊ ရွက်နားမှ ရေစိုနာကွက်စတင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ရွက်နားများခြောက်၍ အနားမညီဘဲ လှိုင်းတွန့်ပုံ ဖြစ်ပေါ်နေသည်။



(၇) စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းရောဂါ (Rice Bacterial leaf streak)
ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Xanthomonas oryzae* pv. *oryzicola*

ရောဂါလက္ခဏာများ

ရွက်ကြောနှင့်အပြိုင်ရေစိုနာအစင်းများ၊ ရောဂါ
အနာကွက်များမှာအလင်းပေါက်နေသည်။
ရောဂါပြင်းထန်ပါက အစင်းများ အဝါရောင်မှ
လိမ္မော် ရောင် ပြောင်းသွားသည်။



(၈) စပါးမြစ်ဖုနီမတုတ်ရောဂါ (Root knot nematode)
ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Meloidogyne graminicola*

ရောဂါလက္ခဏာများ

အရွက်များဝါခြင်း၊ အပင်များ ပုနေခြင်း၊ ပင်ပွား
ကောင်းစွာ မထွက်နိုင်ခြင်းများကို အကွက်
လိုက်တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ အပင်ကို နှုတ်ကြည့်
ပါကအမြစ်များ ဖေါင်းနေခြင်း၊ ဖုနေခြင်း၊
အမြစ်ထိပ်များ ကောက်နေခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်



စပါးတွင်ကျရောက်တတ်သောရောဂါများအတွက် အသုံးပြုနိုင်သော မှီသတ်ဆေးများ

စဉ်	ရောဂါအမည်	အသုံးပြုနိုင်သော မှီသတ်ဆေးများ
၁	စပါးဂုတ်ကျိုးရောဂါ (Rice Blast)	➤ Isoprothiolane (အိုင်ဆိုပရိုသိုင်အိုလိန်း) ➤ Tricyclazole (ထရိုင်ဆိုက်ကလာဇီး) ➤ Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိတ်မီသိုင်း) ➤ Metominostrobin (မီသိုမီနိုစထရိုဘင်) ➤ Prochloraz (ပရိုကလိုရာဇ်)
၂	စပါးရွက်ဖုံးခြောက်ရောဂါ (Sheath blight)	➤ Validamycin (ဗယ်လီဒါမိုင်စင်) ➤ Azoxystrobin(အဆိုဆီစထရိုဘင်) ➤ Hexaconazole (ဟက်ဇာကိုနာဇီး) ➤ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇီး) ➤ Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိတ်မီသိုင်း)
၃	စပါးရွက်ညိုပြောက်ရောဂါ (Brown spot)	➤ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇီး) ➤ Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိတ်မီသိုင်း)

		➤ Iprodione (အိုင်ပရိုဒီရိုင်း)
၄	စပါးရွက်ညိုပြောက်ရှည်ရောဂါ (Narrow brown spot)	➤ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး) ➤ Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး) ➤ Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိတ်မီသိုင်း) ➤ Iprodione (အိုင်ပရိုဒီရိုင်း)
၅	စပါးမှိုသီးရောဂါ (False smut)	➤ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး) ➤ Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး) ➤ Azoxystrobin (အဆိုဆီစထရိုဘင်) ➤ Hexaconazole ဟက်ဇာကိုနာဇိုး)
၆	စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်ခြောက်ရောဂါ (Rice Bacterial leaf blight)	➤ Copper Oxychloride (ကော့ပါးအောက်ဆီကလိုရိုင်း) ➤ Copper Hydroxide (ကော့ပါးဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) ➤ Kasugamycin (ကာစူဂါမိုင်းစင်) ➤ Bismethiazol (ဗစ်မာသီယာဇိုးလ်)
၇	စပါးဘက်တီးရီးယားရွက်စင်းရောဂါ (Rice Bacterial leaf streak)	➤ Copper Oxychloride (ကော့ပါးအောက်ဆီကလိုရိုင်း) ➤ Copper Hydroxide (ကော့ပါးဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) ➤ Kasugamycin (ကာစူဂါမိုင်းစင်) ➤ Bismethiazol (ဗစ်မာသီယာဇိုးလ်)
၈	စပါးမြစ်ဖုနီမတုတ်ရောဂါ (Root-knot nematode)	➤ Fosthiazate (ဖေါ့စ်သီယာဇိတ်)

ဆီထွက်သီးနှံများတွင် ကျရောက်တတ်သောရောဂါများ

မြေပဲ

(၁) မြေပဲရွက်ပြောက်ရောဂါများ (ရွက်ညိုပြောက်/ရွက်နက်ပြောက်) (Cercospora leaf spots)

ရောဂါဖြစ်စေသက်ရှိ - *Cercospora arachidicola* (Hori)

- *Cercospora personata* (Berk. & Curtis) Ellis & Everh.)

ရောဂါလက္ခဏာများ

အရွက်ပေါ်တွင် ပုံသဏ္ဌာန်မမှန်သော အညိုရောင် အပြောက်များနှင့်လုံးဝိုင်းလုနီးပါး အနက်ပြောက်များတွေ့ရသည်။ ရွက်ညိုပြောက်ကအရင်ကျပြီး ရွက်နက်ပြောက်က နောက်မှ ကျသည်။ ရွက်ပြောက်ရောဂါကျရောက်ပါကအစာချက်လုပ်နိုင်သော ဧရိယာ နည်းပါး သွား သဖြင့် အပင်အထွက်ကို ထိခိုက်စေသည် ရောဂါပြင်းထန်ပါက ရောဂါ ကွက်များပေါင်းစပ် သွားပြီး အရွက်ခြောက်ကာကြွေကျသွားသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ


- ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးကိုစိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါရပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- သီးနှံအလှည့်ကျစိုက်ပါ။
- ရောဂါစတင်ကျရောက်ပါက ၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)၊ Difenconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး)၊ Hexaconazole (ဟက်ဇာကိုနာဇိုး) Prochloraz (ပရိုကလောရာဇ်) စသောဆေးများကိုအသုံးပြုပက်ဖျန်းပါ။

(၂) မြေပဲပင်ရင်းပုပ်ရောဂါ (Collar rot)

ရောဂါဖြစ်စေသက်ရှိ - *Aspergillus niger* Tiegh.

ရောဂါလက္ခဏာများ

အပင်ငယ်စဉ်တွင်မြေပြင်နှင့်ကပ်နေသော ပင်စည်ပိုင်းတွင် အနာကွက်ဖြစ်ပြီး အညိုရင့် (သို့မဟုတ်) အမဲရောင်စပိုးများကို တွေ့ရသည်။ အပင်ကြီးလာပါက အပင်ရင်းပုပ် ဆွေးပြီး အမဲရောင်စပိုးများနှင့်ဖုံးအုပ်နေပြီး အရွက်များခြောက်၍ ကြွေကျသွားသည်။ မြေပဲတောင့်တွင်ကျရောက်ပါက အတောင့်ပေါ်တွင် အမဲရောင်မှို ကွက်များဖြစ်ပေါ်ပြီး အတောင့်ပုပ်သွားသည်။ ရောဂါဖြစ်စေသောမှိုသည် အစေ့နှင့်ပျိုးပင်ပေါက်လေးများကိုလည်း တိုက်ခိုက်သည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- မျိုးစေ့များကို မြေနက်နက်တွင်စိုက်ခြင်းဖြင့် ရောဂါရလွယ်စေသည့် အတွက် အတိမ်အနက်မှန်အောင် မျိုးစေ့ချစိုက်ပါ။
- ပေါင်းသင်ခြင်း၊ မြေတောင်မြှောက်ခြင်း ပြုလုပ်ရာတွင် အပင်များ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ မရရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ပါ။
- မျိုးစေ့များကို မစိုက်ပျိုးမီ မျိုးစေ့လူးနယ် မှိုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးနှင့်လူးနယ် စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါစတင်ကျရောက်ပါက Difenconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး)၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)၊ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး) စသောမှိုသတ်ဆေးများကိုအသုံးပြုပက်ဖျန်းပါ။

(၃) မြေပဲသံချေးရောဂါ (Rust)


ရောဂါဖြစ်စေသက်ရှိ - *Puccinia arachidis* Speg.

ရောဂါလက္ခဏာများ

မြေပဲရွက်၏အောက်မျက်နှာပြင်တွင် လိမ္မော်ရောင်စပိုးစု အဖုကလေးများကို စတင် တွေ့ရသည်။

ရောဂါပြင်းထန်ပါက အပေါ်မျက်နှာပြင်အထိ မှိုစပိုးများပျံ့နှံ့သွားသည်။

နောက်ပိုင်းတွင်အရွက်တစ်ခုလုံးခြောက်၍သေသွားပြီးအပင်တွင်တွယ်ကပ်နေသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးကိုစိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါရပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- ပေါင်းမြက်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- မြေပဲကို ဆက်တိုက်စိုက်ပျိုးခြင်းသည် ရောဂါကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသဖြင့် ရိတ်သိမ်းပြီး သည်နှင့် မြေကိုလှုပ်ထားပါ။
- ရောဂါစတင်ကျရောက်ပါက Mancozeb (မန်ကိုဇက်)၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)၊ Difenconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး)၊ Hexaconazole (ဟက်ဆာကိုနာဇိုး)၊ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး) စသောဆေးများကို အသုံးပြု ပက်ဖျန်းပါ။

နှမ်း

(၁) နှမ်းရိုးမည်း/ အမြစ်ပုပ်/ မီးသွေးပုပ်ရောဂါ (Black stem/Root rot/ Charcoal rot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Rhizoctonia bataticola* (Taubenh.) E. J. Butler,

- *Macrophomina phaseolina* (Tassi) Goid

ရောဂါလက္ခဏာ

အပင်၏အောက်ရွက်များဝါလာသည်ကိုစတင်တွေ့ရှိရမည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အရွက် များ ငိုက်ကျ၍ အရွက်ကြွေခြင်းများလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ပင်စည်၏ပင်ခြေပိုင်းတွင်အညို/ အမည်း ရောင်အနာကွက်ဖြစ်သည်။ ရောဂါပြင်းထန်လျှင် အနာရွက်တစ်သျှူးသားများ ညိုမဲပြီး အနာချိုင့် ဖြစ်လာသည်။ အခေါက်များဖွာလန်လာသည်။ ရောဂါရတစ်သျှူးများပေါ်တွင် ခပ်မည်းမည်း အဖု လေးများဖြစ်ပေါ်သည်။ နှမ်းပင်ခြေရင်း ပိုင်းလုံးဝမဲနက်ပြီး ပင်ပေါ်ပိုင်းလည်း အဝါရောင်ပြောင်း ကာ ညှိုးစပြုလာသည်။ ရောဂါရနှမ်းရိုးကို ထက်ခြမ်းခွဲကြည့်ပါက မှိုမျှင်စုများတွေ့နိုင် သည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ


- စိုက်ခင်းရေမဝပ်စေရန်ဆောင်ရွက်ပါ။
- ကြားပေါင်းလိုက်ရာတွင်အပင်များထိခိုက်မှုမရှိစေရ။
- သီးလှည့်စံနစ်ဖြင့်စိုက်ပါ။
- ရောဂါရပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို မီးရှို့ဖျက်ဆီးပစ်ပါ။
- ရောဂါစတင်တွေ့ရှိပါက Mancozeb (မန်ကိုဇက်)၊ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)၊ Azoxystrobin (အဆိုဆီစထရိုဘင်) စသောမှိုသတ် ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ပက်ဖျန်း အသုံးပြုပါ။ အပင်နှင့်အပင်ခြေရင်း သို့ရွှဲဖျန်းပါ။

(၂) အော်တာနေးရီးယားရွက်ခြောက်ရောဂါ (Alternaria blight)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Alternaria sesami* (E. Kawam.) Mohanty & Behera

ရောဂါလက္ခဏာ

အရွက်ပေါ်တွင် သေးငယ်သော၊ ဗဟိုတူစက်ဝိုင်းရစ်များပါသည့် လုံးဝိုင်းပုံ (သို့) ပုံသဏ္ဌာန် မမှန်သော အညိုရင့်ရောင်ရေစိုနာဒါဏ်ရာ ကွက်များဖြစ်ပေါ်သည်။ ရာသီဥတု အခြေအနေပေး၍ ရောဂါ ပြင်းထန်ပါက ရောဂါကွက်သည်ကြီးမားလာသည်။ အပင်၏ အစိတ်အပိုင်းအားလုံး၊ အရွယ်အားလုံးတွင်ကျရောက်တတ်သည်။ အရွက်ကြွေခြင်း၊ ပြင်းထန်ပါက အပင်သေခြင်းများ ဖြစ်တတ်သည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ


- ခံနိုင်ရည်ရှိသော နှမ်းမျိုးကို စိုက်ပါ။
- အခြားသီးနှံများနှင့်သီးလှည့်စိုက်ပါ။
- ရေမဝပ်စေရန်ဆောင်ရွက်ပါ။
- ရောဂါရပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို ဖျက်ဆီးပါ။
- ရောဂါစတင်ကျရောက်ပါက အောက်ဖော်ပြပါ မှီသတ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုး အသုံးပြု ပက်ဖျန်းပါ။
 - Myclobutanil (မိုက်ကလိုဗျူသာနေးလ်)၊ Mancozeb (မန်ကိုဇက်)၊ Iprodione (အိုင်ပရိုဒီအိုနီး)၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုထာလိုနေးလ်)၊ Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိုတ်မီသိုင်း)

(၃) ဖားဥမှိုရောဂါ (Powdery mildew)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Oidium sesami* Schembel

ရောဂါလက္ခဏာ

အရွက်ပေါ်တွင် အဖြူရောင်အကွက်များ စတင်ဖြစ်ပေါ်သည်။ အရွက်မျက်နှာပြင် တစ်ခုလုံးပေါ်၌ ပေါင်ဒါမှုန့်များ ပက်ဖြူးထားသကဲ့သို့ဖြူဖွေးနေသည်။ ရောဂါပြင်းထန်ပါက အရွက်တစ်ခုလုံးခြောက်၍ တွန့်သွားသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ဒေသအလိုက်ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးကိုသုံးပါ။
- ရောဂါဆိုးဝါးစွာနှစ်စဉ်ကျပါကအခြား သီးနှံများဖြင့် အလှည့်ကျစိုက်ပါ။
- ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များဖျက်ဆီးမီးရှို့ပါ။
- ရောဂါစတင်တွေ့ရှိပါက Sulfur ပါဝင်သောဆေး၊ Hexaconazole (ဟက်ဇာကိုနာဇိုး)၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး)၊ Difenconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး) စသောမှိုသတ်ဆေး များဖြင့် ထိရောက်စွာ ကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

(၄) နှမ်းဖိုရောဂါ (Sesamum Phyllody)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - Phloem-Limiting Phytoplasmas

ရောဂါလက္ခဏာ

အရွက်သေးငယ်ခြင်း၊ ဆစ်ကြားတိုခြင်း၊ ကြားဖူးများမှ မူမမှန်ကိုင်းများစွာထွက်ခြင်း၊ အပွင့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအစိမ်းရောင်ဖြစ်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်သည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- စိုက်ခင်းအတွင်းပေါင်းမြက်များကိုရှင်းလင်းပါ။
- စောစောစိုက်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။
- မျိုးစေ့များအား မျိုးစေ့လူးနယ်ပိုးသတ်ဆေး အင်မီဒါကလိုပရစ် (Imidacloprid) ဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါကူးစက်ပျံ့နှံ့စေသောဖြုတ်ပိုး(Leafhopper) ကို နှမ်းပင်ငယ်စဉ်တွင် ပင်လုံး ပြန့်ပိုးသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းပါ။
- အင်မီဒါကလိုပရစ် (Imidacloprid)
- ဒိုင်မီသိုအိတ် (Dimethoate)
- အဆီဖိတ် (Acephate)

နေကြာ

(၁) နေကြာပင်ခြေပုပ်ရောဂါ (Collar rot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Sclerotium rolfsii* (Sacc)

ရောဂါလက္ခဏာ

ပင်ခြေတွင် အဖြူရောင်ဝါဂွမ်းကဲ့သို့ မှိုမျှင်စုများနှင့် မုန်ညင်းစေ့သဏ္ဌာန် လိမ္မော်ရောင်/ အညိုရောင် အလုံးငယ်များ (စကလိုရှား) ကိုတွေ့မြင်ရသည်။ ရောဂါပြင်းထန်ပါက အပင်ညှိုးသေသွားသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးကိုအသုံးပြုပါ။
- စိုက်ခင်းတွင် အစိုဓာတ်မလွန်ကဲစေရ။
- မျိုးစေ့များကို မျိုးစေ့လူးနယ်မှိုသတ်ဆေး တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်လူးနယ်ပြီးမှ စိုက်ပါ။
- ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များအားမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- ပိုတက်ရှ်မြေဩဇာထည့်ပေးခြင်းသည် ရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းကို ကျဆင်း စေသည်။
- မြေပြုပြင်စဉ်တွင် ထရိုင်ဂိုဒါးမားမှိုကို ထည့်ပေးပါ။
- Azoxystrobin (အဆိုဆီစထရိုဘင်)၊ Hymexazol (ဟိုင်မီဇေဇိုလ်)၊ Validamycin (ဗယ်လီဒါမိုင်စင်)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇို)၊ Captan (ကက်ပီတန်) စသော မှိုသတ်ဆေးတစ် မျိုးမျိုး ဖြင့် အပင်ခြေရင်းသို့ရွှံ့ ပတ်ဖျန်းပါ။

(၂) နေကြာရွက်ခြောက်ရောဂါ (Leaf blight of Sunflower)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Alternaria helianthi* (Hansf.) E.G. Simmons

ရောဂါလက္ခဏာ

အရွက်ပေါ်တွင်ပုံသဏ္ဌာန် အမှန်မရှိသော အလယ်တွင် ဖြူမွဲရောင်ရှိသည့် ညိုမဲရောင် ကွက်ပြောက်များဖြစ်ပေါ်သည်။ ရောဂါရင့်လာ ပါကသေးငယ်သော အမဲရောင် ဒါဏ်ရာကွက် များကို ရွက်ရိုးတံ၊ ပင်စည်နှင့်ပွင့်ဖတ် များတွင်တွေ့ရသည်။ ရွက်ပြောက်များသည် အရွယ်အစား ကြီးမားလာပြီးပေါင်းစပ်သွားကာ အရွက်များ ညှိုး၍ တွန့် ခြောက်လာသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- သီးနှံအလှည့်ကျစိုက်ပါ။
- ရောဂါရအပင်အကြွင်းအကျန်များကို မီးရှို့ပါ။
- သီးနှံမစိုက်မီကာလတွင် စိုက်ခင်းမြေအား ထယ်ထိုး၍ နေလှမ်းထားပါ။
- မျိုးစေ့လူးနယ်မှုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် လူးနယ်စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အပင်ငယ် စဉ် ရောဂါကျရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
- ရောဂါကျရောက်ပါက မှိုသတ်ဆေး Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)၊ Mancozeb (မန်ကိုဇက်)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး)၊ Iprodione (အိုင်ပရိုဒီယွန်း) မှိုသတ်ဆေးများအသုံးပြုနိုင်သည်။

(၃) ပင်စည်ပုပ်ရောဂါ (Charcoal rot/Stem rot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid*

ရောဂါလက္ခဏာ

နေကြာပင်ပန်းပွင့်ပြီးနောက်ပိုင်း အပူချိန်မြင့်ခြင်း၊ ရေငတ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဤရောဂါ အဖြစ်များသည်။ မြေပြင်နှင့်ကပ်လျက် ပင်စည်ပိုင်းတွင်အရောင်ပျက်ကာ မီးခိုးရောင် (သို့) ငွေရောင် ရောဂါကွက်ကိုတွေ့ရသည်။ ပင်စည်သည်ခြောက်လာပြီး ခွဲကြည့်ပါက အမဲရောင်မှုစပိုး များကို မီးသွေးမှုန့်များသဖွယ်တွေ့ရသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ပူပြင်းခြောက်သွေ့ပြီး ရေငတ်လျှင်ရောဂါကျရောက်တတ်သဖြင့် ရေရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပါ။
- ပိုတက်ရှ် မြေဩဇာနှင့် သဘာဝမြေဩဇာများကိုအတတ်နိုင်ဆုံး ထည့်သွင်း ပေးပါ။
- ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များအားမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- ရောဂါကျရောက်ပါကအောက်ပါမှိုသတ်ဆေးတစ်မျိုးမျိုးဖြင့် အပင်ခြေရင်း သို့ရွဲရွဲ ပက်ဖျန်းပါ။
- Thiophanate methyl (သိုင်အိုဖါနိုတ်မီသိုင်း)၊ Captan (ကက်ပီတန်)၊ Tebuconazole (တက်ဗျူကိုနာဇိုး)၊ Hymexazol (ဟိုင်းမီဇာဇိုးလ်)
- Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး)

(၄) သံချေးရောဂါ

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Puccinia helianthi* Schwein.

ရောဂါလက္ခဏာ

အရွက်၊ ပင်စည်၊ ပွင့်ဖတ်တို့တွင်ကျရောက်တတ်သည်။ အရွက်အပေါ် မျက်နှာပြင် တွင် သေးငယ်သော အညိုရောင်၊ သံချေးရောင် ကွက်ပြောက်ကလေးများကို တွေ့ရသည်။ ရောဂါ ကွက်ဘေးပတ်လည်ရှိတစ်ရှူးသားများသည် အစိမ်းဖျော့ရောင်၊ အဝါရောင်ဖြစ်နေသည်။ အရွက် အောက်မျက်နှာပြင်တွင် သံချေးရောင် မှိုစပိုင်း အဖုကလေးများကို တွေ့ရသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ခံနိုင်ရည်ရှိသော မျိုးကိုစိုက်ပျိုးပါ။
- ရောဂါခိုအောင်းရာဖြစ်သောပေါင်းပင်များကိုဖျက်ဆီးမီးရှို့ပါ။
- ရောဂါရပင်ကြွင်းပင်ကျန်များကို စုပုံမီးရှို့ပါ။
- ရောဂါကွက်စတင်တွေ့ရှိပါက ရောဂါစတင်ကျရောက်ပါက Hexaconazole (ဟက်ဇာကို နာဇိုး)၊ Propiconazole (ပရိုပီကိုနာဇိုး)၊ Captan (ကက်ပီတန်)၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)၊ Difenoconazole (ဒီဖီနိုကိုနာဇိုး) စသောမှိုသတ်ဆေး များ ဖြင့် ထိရောက်စွာ ကာကွယ် နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

(၅) နေကြာခေါင်းပုပ်ရောဂါ (Rhizopus head rot)

ရောဂါဖြစ်စေသောသက်ရှိ - *Rhizopus arrhizus* A. Fisch. (*Rhizopus oryzae* Went & Prinsen Geerligs)

ရောဂါလက္ခဏာ

ရောဂါသည် နေကြာပွင့်၏ နောက်ကျောဖက်တွင် အမဲစက်များပထမဆုံးအဖြစ် ပေါ်လာသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ကြီးထွားလာကာ ရေစိုနာကဲ့သို့ ဖြစ်လာပြီး ပျော့ပုပ်လာကာ အညိုရင့်ရောင်သို့ပြောင်းသွားသည်။ ရောဂါပြင်းထန်လာပါက နေကြာပွင့်များသည် အချိန်မတိုင်မီ ခြောက်သွေ့သွားပြီး တစ်ရှူးများကွဲ အက်သွားတတ်သည်။

နေကြာပွင့်၏ နေကြာစေ့များပေါ်တွင် မီးခိုးရောင် မှိုမျှင်စုများကိုတွေ့နိုင်သည်။ ၎င်းမှိုမျှင်များမှ မှိုစပိုင်းများသည် လေနှင့်အတူပျံ့နှံ့၍ အခြားအပင်များကိုပါ ရောဂါ ကူးစက် စေသည်။

ရောဂါဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုအားပေးသောရာသီဥတုနှင့်တွေ့ဆုံပါကဆုံးရှုံးမှု မြင့်မားစေသည်။ နေကြာပွင့်တွင် အင်းဆက်နှင့်ငှက်များဖျက်ဆီးမှုနှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာများမှတစ်ဆင့် လေထဲတွင်ရှိနေသော ၎င်းမှိုများဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်၍ ရောဂါဖြစ် စေသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ပန်းပွင့်ပြီးနောက် နေကြာပွင့်များထိခိုက်ဒဏ်ရာမရရှိစေရန် ဂရုစိုက်ကာကွယ်ပါ။
- နေကြာပန်း ပွင့်အား အင်းဆက် (နေကြာဖလံ) နှင့်ငှက်များ စားသောက် ဖျက်ဆီး မှုမရှိစေရန် ကာကွယ်နှိမ်နင်းပါ။
- အင်းဆက်များခုခံအောင်းရာဖြစ်သော အလေ့ကျပေါက်သည့် နေကြာရိုင်းများ နှင့် အခြားပေါင်းပင်များအားဖျက်ဆီးပါ။
- မျိုးစေ့တွင်ရောဂါဖြစ်စေသောမှိုများ ပါဝင်လာမှုမရှိစေရန် မျိုးစေ့လူးနယ်ဆေး (မှိုသတ်ဆေး) တစ်မျိုးမျိုးဖြင့်လူးနယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- နေကြာပန်းပွင့်ပြီးနောက် ဒဏ်ရာများမှတစ်ဆင့် ရောဂါဝင်ရောက်မှုမရှိစေရန် Mancozeb (မန်ကိုဇက်)၊ Zineb (ဇိနက်ဘ်)၊ Chlorothalonil (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)၊ Captan (ကက်ပံတန်) စသောမှိုသတ်ဆေးများဖြင့် ပက်ဖျန်းကာကွယ်ပါ။

(၆) နေကြာဒေါင်းနီးမှိုရွက်ခြောက်ရောဂါ (Downy mildew of Sunflower)

ရောဂါဖြစ်စေသက်ရှိ - *Plasmopara halstedii* (Farl.) Berl. & De Toni

ရောဂါလက္ခဏာ

ရောဂါလက္ခဏာများကို အပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်တိုင်းတွင် တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ရောဂါ ကျရောက်သော အရွက်များ၏ အပေါ်မျက်နှာပြင်များတွင် အရောင်ဖျော့ဖျော့မှ အဝါရောင် အကွက်များသည် ရွက်ကြော တစ်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်ပြီး အပြင်ဘက်သို့ ပျံ့နှံ့သွားသည်။ စိုထိုင်းမှုမြင့်မားသော အခြေအနေတွင် အရွက်၏ အောက်မျက်နှာပြင်တွင် အဖြူရောင်မှိုမျှင်များ ဖြင့် ဖုံးအုပ် ထားသည် ကိုတွေ့ရသည်။



ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများ

- ခံနိုင်ရည်ရှိသောမျိုးကိုရွေးချယ်စိုက်ပျိုးပါ။
- ပိုတက်ရှ် မြေဩဇာနှင့် သဘာဝမြေဩဇာများကိုအတတ်နိုင်ဆုံး ထည့်သွင်း ပေးပါ။
- ပင်ကြွင်းပင်ကျန်များအားမီးရှို့ဖျက်ဆီးပါ။
- မျိုးစေ့အား (၁ လကွ၊ ၁လကွခွဲခန့်) စိုက်ပျိုးခြင်းသည် အပင်ပေါက်မှု လျင်မြန်စေပြီး ရောဂါ တိုက်ခိုက်မှုကိုလွှတ်စေသည်။
- စိုက်ခင်းအတွင်းရေစီးရေလာကောင်းစေရန်နှင့်ရေမဝပ်စေရန်ဆောင်ရွက်ပါ။
- အပင်များအား စိပ်စိပ်မစိုက်ပါနှင့်။
- ရောဂါကျရောက်မှုအား အမြဲစစ်ဆေး၍ ရောဂါ ကျရောက်သော လက္ခဏာတွေ့ရှိ ရပါက ၎င်းအပင်အား ဖယ်ရှားပစ်ပါ။

- ရောဂါကျရောက်ပါက Metalaxyl (မီတယ်လဆီ)၊ Propineb (ပရောပီနက်ဘ်)၊ (ကလိုရိုသာလိုနေးလ်)၊ Mancozeb (မန်ကိုဇက်) စသော မှိုသတ်ဆေးများဖြင့် ထိရောက်စွာ ကာကွယ် နှိမ်နင်းနိုင်ပါသည်။

နွေစပါးတွင်ပေါင်းပေါက်ရောက်မှုအပေါ် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်များ

နွေစပါးတွင် ပေါင်းပင်များ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုသည် အစိုဓာတ်နည်းပါးသည့် အခြေအနေတွင် ပိုမို ပြင်းထန်သောကြောင့်ပေါင်းပင်များ၏ကြီးထွားမှုကိုကောင်းစွာနှိမ်နင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍စိုက်ပျိုးနည်းလမ်းများအပါအဝင်ဘက်စုံပေါင်းကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများအသုံးပြုရန် အလေးထားဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။

မစိုက်ပျိုးမီ

- သီးနှံအလိုက်မျိုးရွေးချယ်ရာတွင် ယှဉ်ပြိုင်အားကောင်းသော အောင်မြင်သော မျိုးသန့် မျိုးစေ့များ အသုံးပြုပါ။
- ပေါင်းကင်းစင်သောမျိုးစေ့များကိုအသုံးပြုပါ (မျိုးစေ့ဆားရည်စိမ်ခြင်းနည်းလမ်း အသုံးပြု၍ ပေါင်းစေ့များနှင့်အဖျင်းအမှော်များကိုဖယ်ရှားပါ)။
- မြေပြင်ချိန်တွင်မြက်ခေါင်းကောက်ခြင်း၊ မြက်ဟောင်းဆွေးစေခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပါ။
- ကောင်းစွာဆွေးမြေ့သောသဘာဝမြေဩဇာနှင့်လယ်ယာစွန့်ပစ္စည်းများအသုံးပြုပါ။
- ပေါင်းမျိုးစေ့နှင့်ပင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများမှမျိုးပွားခြင်းမရှိအောင်ဟန့်တားပါ။
- လယ်ယာသုံးကိရိယာများမှမပြန့်ပွားစေရန်အတွက်တခင်းမှတခင်းသို့ကူးရာတွင်သေချာစွာ သန့်ရှင်းပါ။
- မစိုက်ခင်ထွန်ယက်ပြီးမြေပေါ်တွင် အမြန်ကြီးသော ပဲမျိုးရင်းဝင်ပင်များ (ဥပမာ - ညံပင်၊ ပိုက်ဆံလျှော်၊ မြေနိမ့်ချယ်ရီ) စိုက်ပြီးထယ်ထိုးထွန်မွှေခြင်းဆောင်ရွက်ပါ။
- ရိတ်သိမ်းပြီးနောက် ကျန်ရှိသောပေါင်းပင်များကို ရှင်းလင်းပါ။
- မြေကိုနှံ့စပ်စွာထွန်ယက်ပါ။

စိုက်ပျိုးကာလ

- စပါးပင်ကြီးထွားမှုအဆင့်အလိုက် ပေါင်းပင်အမျိုးအစားများကို ခွဲခြားသိရှိပါ။
- ပေါင်းပင်ပေါက်ရောက်မှုကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပါ။

စိုက်ပျိုးပြီးချိန်

- သီးနှံပင်သက်တမ်းအစောပိုင်း (စပါးပင်သက်တမ်း၏သုံးပုံတစ်ပုံ) အတွင်းတွင် ပေါင်းမြက် ရှင်းလင်းရန်

- တိုက်ရိုက်အစေ့ချစနစ်တွင်ပေါင်းလိုက်ရလွယ်ကူစေရန်နှင့်သီးနှံပင်ပြုစုမှုလွယ်ကူစေရန် အစေ့အတန်းချစိုက်စနစ် (Drum seeder အသုံးပြုခြင်း) ဖြင့်စိုက်ပျိုးပါ
- မစိုက်ခင် မြေဖျန်းဆေးအသုံးပြုပါက မစိုက်ခင် ၂ ပတ်အလိုတွင် အသုံးပြုပြီးမှ စိုက်ပျိုးရန် (မြေဖျန်းဆေးအတွက် အစိုဓာတ်ရှိရန် လိုအပ်ပြီး မရှိပါကအသုံးပြုပြီး ၁ ပတ်အတွင်း သွင်းရေ (သို့) မိုးရေရရန် ဆောင်ရွက်ရန်)
- အပင်မပေါက်မီသုံးသောဆေးအား မျိုးစေ့ချပြီး (၀-၆) ရက်အတွင်း အသုံးပြုရန်နှင့် စိုက်ပြီး (သို့) မျိုးစေ့ချပြီး (၂၁) ရက်အကြာတွင် ထပ်မံပေါက်သောပေါင်းများအား ပေါင်းအမျိုး အစား အလိုက် သီးနှံအလိုက် ရွေးချယ်ပေါင်းသတ်ဆေးအသုံးပြုရန်
- ပေါက်ရောက်သော ပေါင်းပင်အမျိုးအစားနှင့် သက်တမ်းပေါ်မူတည်၍ သင့်တော်သော ပေါင်းသတ်ဆေးကို သေချာစွာရွေးချယ်၍ အညွှန်းစာအတိုင်း မှန်ကန်သော ဆေးနှုန်း ထားကို အသုံးပြု၍ နှိမ်နင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။

ပေါင်းကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးသည် စပါးစိုက်ပျိုးရေးတွင် အရေးပါသောအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်တော်သောနည်းလမ်းဖြင့် ကာလမီဆောင်ရွက်ပါက အထွက်နှုန်းတိုးတက်မှုကို သိသာစွာ ရရှိနိုင်ပါသည်။